

Nombres complexes

Généralités

Autocorrection A. ✓

Écrire chacun des nombres complexes suivants sous forme algébrique, et calculer son module.

(i) $\frac{1}{i}$;

(iv) $\frac{(2+3i)^2}{4-2i}$;

(vii) $\frac{2+5i}{1-i} + \frac{2-5i}{1+i}$;

(ii) $\frac{1+i}{1-i}$;

(v) $\frac{1+i\sqrt{3}}{\sqrt{3}-i}$;

(viii) $\frac{2}{1-i\sqrt{3}}$;

(iii) $\frac{1+2i}{1-3i}$;

(vi) $\left(\frac{1+i}{2-i}\right)^2$;

(ix) $\frac{(5-i)^6}{(3+2i)^5}$.

Autocorrection B. ✓

Résoudre les équations suivantes dans \mathbb{C} .

(i) $3z - (3-i)\bar{z} = 1 - 2i$;

(ii) $2z + 6\bar{z} = 3 + 2i$;

(iii) $(3+4i)z - 5\bar{z} = 2i$.

Exercice 1. 💡✓

Trouver tous les nombres complexes z tels que $(z-2)(\bar{z}+i) \in \mathbb{R}$.

Exercice 2. 💡✓

L'assertion $\exists(a, b) \in \mathbb{C}^2 : \forall z \in \mathbb{C}, \bar{z} = az + b$ est-elle vraie ou fausse ?

Exercice 3⁺. ✓

Soit $\alpha \in \mathbb{C}$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur α pour que l'on ait l'équivalence

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x + \alpha y = 0 \Leftrightarrow x = y = 0.$$

Exercice 4. ✓

On note $\mathcal{S} = \{n^2 + m^2 \mid (n, m) \in \mathbb{Z}^2\}$.

1. Exhiber un entier naturel n'appartenant pas à \mathcal{S} .
2. En utilisant la formule $\forall z, z' \in \mathbb{C}, |zz'|^2 = |z|^2 |z'|^2$, montrer que \mathcal{S} est stable par produit, c'est-à-dire que $\forall p, q \in \mathcal{S}, pq \in \mathcal{S}$.
3. On pose $\mathcal{S}' = \{n^2 + m^2 + o^2 \mid (n, m, o) \in \mathbb{Z}^3\}$. Montrer que $15 \notin \mathcal{S}'$ et en déduire que \mathcal{S}' n'est pas stable par produit.

Exercice 5. ✓

En utilisant $j = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, montrer que $\{a^2 - ab + b^2 \mid (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$ est stable par produit.

Exercice 6. 💡

Soit a, b et $c \in \mathbb{Z}$ tels que $ab + bc + ca = 1$. Montrer que $(1+a^2)(1+b^2)(1+c^2)$ est un carré parfait.

Équations du second degré

Autocorrection C.

Déterminer les racines carrées des nombres suivants.

- (i) i ; (ii) $3 - 4i$; (iii) $8 - 6i$; (iv) $24 - 10i$; (v) $1 + 2i$.

Autocorrection D.

Soit $m \in \mathbb{R}^*$. Résoudre, dans \mathbb{C} , les équations suivantes.

- (i) $z^2 + z + 1 = 0$; (iv) $4z^2 - 16z + 11 - 12i = 0$;
(ii) $z^2 - 2iz + 2 - 4i = 0$; (v) $z^4 - (5 - 14i)z^2 - 2(5i + 12) = 0$;
(iii) $z^2 - 2iz - 1 + 2i = 0$; (vi) $mz^4 + (m - i)z^2 - i = 0$.

Autocorrection E.

Trouver les couples $(x, y) \in \mathbb{C}^2$ satisfaisant les systèmes d'équations suivants.

- (i) $\begin{cases} x + y = 2 \\ xy = 2, \end{cases}$ (iii) $\begin{cases} x + y = 3 + 4i \\ xy = 5 + 15i, \end{cases}$
(ii) $\begin{cases} x + y = 3i \\ xy = -1 - 3i, \end{cases}$ (iv) $\begin{cases} x + y = 1 + i \\ xy = 2. \end{cases}$

Exercice 7.

Déterminer les $m \in \mathbb{R}$ tels que l'équation

$$z^3 + (3 + i)z^2 - 3z - (m + i) = 0 \quad (E_m)$$

ait au moins une solution réelle.

Exercice 8.

Résoudre les équations suivantes, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

- (i) $z^4 - 6z^2 + 25 = 0$; (ii) $z^4 - (3 + 2i)z^2 + 8 - 6i = 0$.

Relations coefficients-racines (pour les polynômes du second degré)

Exercice 9.

Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Trouver $p, q \in \mathbb{R}$ tels que $z^2 + pz + q = 0$.

Exercice 10⁺.

Soit p et q deux nombres complexes, avec $q \neq 0$. On suppose que les deux racines de $X^2 - pX + q^2$ ont le même module.

Exprimer le quotient $\frac{p^2}{q^2}$ en fonction des deux racines, et en déduire que $\frac{p}{q} \in \mathbb{R}$.

Exponentielle complexe

Autocorrection F.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Mettre les nombres complexes suivants sous forme exponentielle.

- (i) $2 - 2i$; (iii) $1 + j$; (v) $e^{e^{i\theta}}$;
(ii) $\frac{-1 + i\sqrt{3}}{\sqrt{3} + i}$; (iv) $e^{i\theta} + e^{2i\theta}$; (vi) $1 + \cos \theta + i \sin \theta$.

Autocorrection G.

Calculer $\frac{(1-i)^{10}(\sqrt{3}+i)^5}{(-1-i\sqrt{3})^{10}}$.

Autocorrection H.

Soit $z = \sqrt{3} + i$. Déterminer les entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que z^n soit dans \mathbb{R} (resp. \mathbb{R}_- , resp. $i\mathbb{R}_+$).

Exercice 11.

Calculer les expressions suivantes (on pourra présenter les résultats sous forme exponentielle).

- (i) $\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{666}$; (iv) $\frac{(1+i)^4}{(1-i)^3} + \frac{(1-i)^4}{(1+i)^3}$;
(ii) $(1+i)^{18}$; (v) $(1+j)^n$ (pour $n \in \mathbb{N}$);
(iii) $\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i}\right)^{20}$; (vi) $(1+i\sqrt{3})^n + (1-i\sqrt{3})^n$.

Exercice 12.

Montrer

$$(2 + i\sqrt{5})^7 + (2 - i\sqrt{5})^7 \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \left(\frac{19+7i}{9-i}\right)^n + \left(\frac{20+5i}{7+6i}\right)^n \in \mathbb{R}.$$

Exercice 13⁺.

- Montrer $\forall n \in \mathbb{N}, \left(\frac{11+7i}{3+5i}\right)^n + \left(\frac{5-5i}{1-3i}\right)^n \in \mathbb{R}$.
- Soit z et $\zeta \in \mathbb{C}$. Montrer que $(\forall n \in \mathbb{N}, z^n + \zeta^n \in \mathbb{R}) \Leftrightarrow (z, \zeta \in \mathbb{R} \text{ ou } z = \bar{\zeta})$.

Exercice 14.

Soit $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$ et $z_1 = e^{i\theta_1}, z_2 = e^{i\theta_2}$.

Calculer $\frac{z_1 + z_2}{1 + z_1 z_2}$, après avoir déterminé à quelle condition ce quotient avait un sens.

Exercice 15.

- Montrer que si $z \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$, alors $i \frac{1+z}{1-z} \in \mathbb{R}$.
- Soit $z \in \mathbb{U} \setminus \{-1\}$. Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $z = \frac{1+ia}{1-ia}$.

Exercice 16⁺.

Montrer l'égalité $\left\{z \in \mathbb{C}^* \mid z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}\right\} = \mathbb{U} \cup \mathbb{R}^*$.

(In)égalités sur les modules

Exercice 17. Soit $a, b \in \mathbb{C}$. Montrer que $|a| + |b| \leq |a + b| + |a - b|$ et préciser les cas d'égalité.

Exercice 18. Montrer que pour tous $a, b, c \in \mathbb{C}$, on a $|1 + a| + |a + b| + |b + c| + |c| \geq 1$.

Exercice 19. Soit $z \in \mathbb{C}$. Montrer $\frac{|\operatorname{Ré} z| + |\operatorname{Im} z|}{\sqrt{2}} \leq |z| \leq |\operatorname{Ré} z| + |\operatorname{Im} z|$.

Exercice 20. Montrer que $\forall z \in \mathbb{C}, |e^z| \leq e^{|z|}$ et déterminer les cas d'égalité.

Exercice 21⁺. Déterminer l'ensemble des complexes s'écrivant comme somme de trois complexes de module 1.

Exercice 22. Soit a et b deux nombres complexes de module ≤ 1 . Montrer que $|a + b| \leq \sqrt{2}$ ou $|a - b| \leq \sqrt{2}$.

Exercice 23. Soit $z \in \mathbb{U}$. Montrer que $|1 + z| \geq 1$ ou $|1 + z^2| \geq 1$.

Exercice 24⁺. Soit $z \in \mathbb{C}$. Montrer que $|z^2 - 1| \leq 8 \Rightarrow |z - 2| \leq 5$.

Exercice 25. Soit $x, y, z \in \mathbb{R}$. Montrer que $e^{ix} + e^{iy} + e^{iz} = 0 \Rightarrow e^{i2x} + e^{i2y} + e^{i2z} = 0$.

Exercice 26. Soit $a, b, c \in \mathbb{U}$. Montrer que $|a + b + c| = |ab + bc + ca|$.

Exercice 27. Soit $a, b \in \mathbb{C}$ tels que $|a|, |b| < 1$. Montrer que $\left| \frac{a - b}{1 - \bar{a}b} \right| < 1$.

Exercice 28⁺. Soit $a, b \in \mathbb{C}$. On a $|a + b|^2 \leq (1 + |a|^2)(1 + |b|^2)$.

Exercice 29⁺⁺. Soit $z \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$. Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $|z^n - 1| \geq \sqrt{3}$.

Géométrie plane

Exercice 30 (Identité du parallélogramme).

Soit $z, z' \in \mathbb{C}$. Montrer que $|z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2(|z|^2 + |z'|^2)$ et en donner une interprétation géométrique.

Exercice 31.



1. Écrire sous forme complexe :

- ▶ la rotation de centre $2 - i$ et de rapport $\frac{\pi}{4}$;
- ▶ l'homothétie de centre $3 + 2i$ et de rapport -2 ;
- ▶ la composée $r \circ s$, où r est la rotation de centre 1 et d'angle $\frac{\pi}{2}$ et s la symétrie centrale de centre $i + 3$. Déterminer plus directement cette transformation.

2. Déterminer les type et éléments caractéristiques (centre, angle, rapport, etc.) des transformations suivantes :

- ▶ $z \mapsto e^{i\frac{\pi}{3}}z + 1$;
- ▶ $z \mapsto z + 4 - 2i$;
- ▶ $z \mapsto 3z + i$.

Exercice 32.



Déterminer les ensembles suivants.

- (i) $\{z \in \mathbb{C} \mid z + \bar{z} = |z|\}$;
- (ii) $\{z \in \mathbb{C} \mid |1 + z| \leq 1 \text{ et } |1 - z| \leq 1\}$;
- (iii) $\left\{ z \in \mathbb{C}^* \mid \text{les vecteurs d'affixe } z \text{ et } \frac{1}{z} \text{ soient orthogonaux} \right\}$;
- (iv) $\{z \in \mathbb{C} \mid 0 \text{ est le centre du cercle circonscrit du triangle de sommets } 1, z \text{ et } z + i\}$.

Exercice 33.


Montrer que quatre complexes distincts de $\mathbb{Z}[j] = \{a + bj \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ ne peuvent pas former un carré.

Exercice 34.

Déterminer les $z \in \mathbb{C}^*$ tels que z et ses trois racines cubiques forment un parallélogramme.

Exercice 35⁺ (Théorème « de Napoléon »).

1. Soit $a, b, c \in \mathbb{C}$ deux à deux distincts.
 - (a) Montrer que le triangle (a, b, c) est équilatéral direct si et seulement s'il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$ tel que a, b et c soient les images de $1, j$ et j^2 , respectivement, par $z \mapsto \lambda z + \mu$.
 - (b) En déduire que (a, b, c) est équilatéral direct si et seulement si $a + jb + j^2c = 0$.
2. Dans la figure ci-contre, les trois petits triangles extérieurs sont équilatéraux. Montrer que (a'', b'', c'') est équilatéral.



Exercice 36⁺.



Soit $a, b, c \in \mathbb{U}$ tels que $a + b + c = 0$. Montrer que le triangle de sommets a, b et c est équilatéral.

Trigonométrie

Autocorrection I.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Linéariser (c'est-à-dire exprimer comme des sommes de $\cos(px)$ et $\sin(qx)$, avec p et q des entiers) les expressions suivantes.

- | | | |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| (i) $\cos^3(x)$; | (v) $\cos^5(x)$; | (ix) $\sin^3(x) \cos^3(x)$; |
| (ii) $\sin^3(x)$; | (vi) $\sin^5(x)$; | (x) $\sin^6(x) \cos(x)$; |
| (iii) $\cos^4(x)$; | (vii) $\sin(x) \cos^2(x)$; | (xi) $\sin^2(2x) \cos(3x)$; |
| (iv) $\sin^4(x)$; | (viii) $\sin^3(x) \cos^2(x)$; | (xii) $\cos^3(x) \sin(3x)$. |

Autocorrection J.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Écrire les expressions suivantes comme des sommes de $\cos^p(x) \sin^q(x)$, pour des entiers p et q .

- | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| (i) $\cos(3x)$; | (iii) $\cos(4x)$; | (v) $\cos(5x)$; |
| (ii) $\sin(3x)$; | (iv) $\sin(4x)$; | (vi) $\sin(5x)$. |

Exercice 37.

Calculer $\cos \frac{\pi}{8}$ et $\sin \frac{\pi}{8}$ de deux manières :

- ▶ en calculant les racines carrées de $e^{i\pi/4}$ sous forme algébrique ;
- ▶ en utilisant la formule donnant $\cos(2x)$ en fonction de $\cos(x)$.

Exercice 38.

Calculer $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$, de deux manières :

- ▶ à l'aide de la relation $\frac{\pi}{12} = \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{6}$;
- ▶ à l'aide de la relation $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$.

Exercice 39.

Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $2 \cos \frac{\pi}{2^n} = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{\dots + \sqrt{2}}}}$, où la formule comporte $n - 1$ radicaux.

Cyclotomie

Exercice 40.

Calculer les produits $(a + bj + cj^2)(a + bj^2 + cj)$ et $(a + b + c)(a + bj + cj^2)(a + bj^2 + cj)$, pour $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$.

Exercice 41.

Soit $n \geq 1$ un entier. Déterminer le produit des éléments de \mathbb{U}_n .

Exercice 42⁺.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On définit $Q = \{\omega^2 \mid \omega \in \mathbb{U}_n\}$.

1. Montrer que $Q \subseteq \mathbb{U}_n$.
2. Montrer que $Q = \mathbb{U}_n$ si et seulement si n est impair.

Exercice 43. ☑

1. Démontrer que $1 + 2 \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) + 2 \cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) = 0$.
2. En déduire une équation du second degré vérifiée par $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$, puis une formule pour $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$.
3. Déterminer $\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)$, puis les valeurs de \cos et \sin en $\frac{\pi}{10}$ et $\frac{\pi}{5}$.

Exercice 44. 💡

En utilisant les éléments de \mathbb{U}_7 , exhiber une équation de degré 3 dont $\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right)$ soit solution.

Exercice 45. 💡☑

Soit $\zeta_7 = \exp\left(i\frac{2\pi}{7}\right)$, $A = \zeta_7 + \zeta_7^2 + \zeta_7^4$ et $B = \zeta_7^3 + \zeta_7^5 + \zeta_7^6$.

Calculer $A + B$ et AB , puis en déduire A et B .

Exercice 46⁺.

Soit $\omega \in \mathbb{U}_7 \setminus \{1\}$.

1. Montrer que $\frac{\omega}{1+\omega^2} + \frac{\omega^2}{1+\omega^4} + \frac{\omega^3}{1+\omega^6} = -2$.
2. En déduire la valeur de $\frac{1}{\cos\frac{2\pi}{7}} + \frac{1}{\cos\frac{4\pi}{7}} + \frac{1}{\cos\frac{6\pi}{7}}$.

Équations diverses

Autocorrection K. ☑

Résoudre dans \mathbb{C} les équations suivantes ($n > 1$ est un entier).

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| (i) $z^8 = \frac{1+i}{\sqrt{3}-i}$; | (iii) $z^4 = -7 + 24i$; |
| (ii) $z^n = i$; | (iv) $z^8 - 3z^4 + 2 = 0$. |

Exercice 47.

Résoudre l'équation $1 + \bar{z} = |z|$.

Exercice 48. 💡

Résoudre dans \mathbb{C} les équations suivantes.

- | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| (i) $e^z = 0$; | (iii) $e^z = 1 + i$; | (v) $e^z + 2e^{-z} = i$. |
| (ii) $e^z = i$; | (iv) $e^z + e^{-z} = 1$; | |

Exercice 49.

1. Déterminer l'ensemble des $z \in \mathbb{C}$ tels que $\left| \frac{z+i}{z-i} \right| = 1$.

(On commencera par déterminer pour quelles valeurs de $z \in \mathbb{C}$ l'expression a un sens).

2. Même question avec l'ensemble des $z \in \mathbb{C}$ tels que $\left| \frac{z-3}{z-5} \right| = 1$.

Exercice 50.

Résoudre dans \mathbb{C} l'équation $\operatorname{Re}(z^3) = \operatorname{Im}(z^3)$.

Exercice 51.

Trouver tous les $z \in \mathbb{C}^*$ tels que $z, \frac{1}{z}$ et $1-z$ aient même module.

Exercice 52.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre $z^n = \bar{z}$.

Exercice 53.

Résoudre dans \mathbb{C} les équations suivantes ($\theta \in \mathbb{R}$ est un paramètre, $n > 1$ un entier).

(i) $\bar{z}^7 = \frac{1}{z^2}$;

(iv) $z^5 = 16\sqrt{2} + 16i\sqrt{2}$;

(ii) $z^2 - 2e^{i\theta}z + 2i \sin(\theta)e^{i\theta} = 0$;

(v) $z^7 - 4z^5 - z^2 + 4 = 0$;

(iii) $z^{2n} - 2 \cos(n\theta)z^n + 1 = 0$;

(vi) $z^8 + 2z^7 - 2z - 4 = 0$.

Exercice 54.

Résoudre l'équation $z^3 = 2 + 11i$, en sachant qu'elle possède une solution dans $\{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.

Exercice 55⁺.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre dans \mathbb{C} l'équation $(z+i)^n - (z-i)^n = 0$.

Exercice 56⁺.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathbb{C}$. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur n et A pour que les solutions de $\left(\frac{1+iz}{1-iz} \right)^n = A$ soient réelles.